

IlPlan Pichu – Granier-sur-Aime
Commune d'Aime-La Plagne
23^e journée intersociétés bota organisée par Mouîtiers
Dimanche 12 juin 2022

Oiseaux (Véronique Rémyot, Montmélian)

Faucon crécerelle : vu à deux reprises ; présent jusqu'à la limite supérieure de l'étage alpin
Coucou gris : chant entendu au loin, il peut être vu au-delà de la limite des arbres surtout en adret
Pipit spioncelle : espèce commune des prairies d'altitude ; vol chanté entendu dans les pentes herbeuses au-dessus de notre aire de pique-nique
Accenteur mouchet : espèce discrète, présente partout (sauf en Méditerranée) pourvu qu'il y ait des buissons ; chant entendu plusieurs fois le matin
Rougequeue noir : vu 1 mâle sur les rochers le matin
Merle à plastron : espèce migratrice principalement liées aux boisements résineux du subalpin ; entendu 2 fois et vu 1 mâle le matin au sommet des épicéas
Merle noir : vu à plusieurs reprises le matin
Grive litorne : espèce originaire de la taïga citée en Vanoise seulement depuis les années 1970 ; vu 1 individu posée sur un épicéa mort le matin
Grive draine : entendu le cri et entrevue, même endroit que la Litorne
Fauvette à tête noire : chant beaucoup entendu, vue une fois
Pouillot véloce : le fameux compteur d'écus ou chiff-chaff anglais, espèce discrète sauf pour le chant, entendu le matin
Mésange noire : espèce inféodée aux résineux ; vue et entendue le midi au pique-nique
Corneille noire : vue 2 fois dans les pentes sommitales
Pinson des arbres : vu et entendu plusieurs fois
Serin cini : sans doute en limite supérieure de son habitat ; chant entendu plusieurs fois le matin
Linotte mélodieuse : espèce appréciant les formations secondaires thermophiles ; 2 individus aperçus en vol le matin

Mammifères

Marmottes

Bouquetin : 2 étagnes le matin puis 1 seule, observées à la longue-vue près de la Pointe de la Portette

Papillons

HE *Erynnis tages*, Point de Hongrie

HE *Pyrgus* sp, Hespérie – nombreux sur des excréments sur le sentier mouillé

LY *Callophrys rubi*, Argus de la ronce, Argus vert

LY *Cupido minimus*, Argus frêle – nombreux rassemblés sur le sentier mouillé.

LY *Cyaniris semiargus*, Demi-Argus – qq-uns sur le sentier mouillé, en compagnie de nb Argus frêles

NY *Aglais urticae*, Petite Tortue

NY *Vanessa atalanta*, Vulcain

PA *Papilio machaon*, Machaon

PI *Anthocharis cardamines*, Aurore

PI *Aporia crataegi*, Gazé

PI *Colias hylae/alfacariensis*, Soufré / Fluoré -

PI *Leptidea* sp

PI *Pieris* sp – en vol

GEO *Chiasmia clathrata*, Réseau, Géomètre à barreaux

GEO *Psodos quadrifaria*, Ruban fauve

GEO *Siona lineata*, Divisée, Phalène blanche

GRA *Phyllocnistis populiella*, Mineuse serpentine du tremble – microlépidoptère (Gracillariidae) dont la larve mine les feuilles de tremble : galerie très sinueuse, blanchâtre avec ligne médiane noire constituée de ses excréments.

LAS *Lasiocampa quercus*, Bombyx du chêne – nous voyons une femelle (gros abdomen, antennes filiformes), beige, bande discale plus claire et diffuse, point discal blanc. Le mâle est plus petit, brun chocolat, bande jaune d'or, point discal blanc. Le mâle est actif le jour, la femelle plutôt nocturne. La femelle avec ses phéromones peut attirer un mâle venu de très loin. Les œufs sont dispersés au hasard, en vol. Donc, de nombreux œufs et chenilles polyphages : elles se développent sur de nombreux arbres (chêne, prunier, bouleau, saule, hêtre...), arbustes (*Crataegus*, *Rubus*, *Genista*...), plantes (callune, lierre, ronce...) Biotopes variés jusqu'à 2000 m.

NOC *Autographa gamma*, Gamma

PYR *Pyrausta nivalis*, Pyrauste olivacée

Autres insectes

COL *Brachyta interrogationis*, Brachyte point d'interrogation - Longicorne commun en montagne, 12-15 mm. Nombreuses formes : souvent fond jaune avec 5 taches noires, mais parfois tout noir, ou noir avec les ébauches des taches jaunâtres sur les côtés externes des élytres, parfois fond noir avec les taches jaunâtres qui ont largement fusionné. On les a toutes vues ! Adultes floricoles (se nourrissent de pétales de fleurs), les larves se développent dans les racines.

COL *Cantharis tristis*, Cantharis ou Téléphore triste – tout noir sauf 1ers articles antennaires et apex des tergites orange. Espèce d'altitude (Alpes, Pyrénées)

COL *Hippodamia variegata*, Coccinelle des friches

COL *Meloe proscarabeus* / *violaceus*, Meloé printanier / Meloé violacé – pas facile de distinguer les 2 espèces et les sexes ! mâle : antennes fortement coudées au niveau articles 6 et 7, femelle : antennes un peu moins coudées.

COL *Phyllopertha horticola*, Hanneton des jardins

COL *Elateridae* sp - taupin

Araignées

Aculepeira ceropegia, Epeire feuille de chêne

Claudie Desjacquot, Groupe Nature de Faverges

claudie.desjacquot54@orange.fr