

<i>Ptychotis saxifraga</i> (L.) Loret & Barrandon	Astragale toujours verte
Ptychotis à feuilles de saxifrage	<i>Hippocrépis comosa</i> L.
<i>Carlina acanthifolia</i> All. subsp. <i>acanthifolia</i>	Hippocrépide à toupet
Carline à feuilles d'Acanthe	<i>Lotus corniculatus</i> L.
<i>Carlina acaulis</i> subsp. <i>caulescens</i> (Lam.) Schübl. & Martens	Lotier corniculé
Carline à petite tige	<i>Ononis fruticosa</i> L.
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Bugrane buissonnant
Carline commune	<i>Ononis natrix</i> L.
<i>Cichorium intybus</i> L.	Bugrane jaune
Chicorée sauvage	<i>Ononis rotundifolia</i> L.
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Bugrane à feuilles rondes
Epine-vinette	<i>Fagus sylvatica</i> L.
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Hêtre
Aulne glutineux	<i>Gentiana angustifolia</i> Vill.
<i>Betula pendula</i> Roth	Gentiane à feuilles étroites
Bouleau blanc	<i>Globularia bisnagarica</i> L.
<i>Echium vulgare</i> L.	Globulaire allongée
Vipérine vulgaire	<i>Globularia cordifolia</i> L.
<i>Arabis ciliata</i> Clairv. subsp. <i>ciliata</i>	Globulaire à feuilles cordées
Arabette ciliée	<i>Ajuga genevensis</i> L.
<i>Arabis collina</i> Ten.	Bugle de Genève
Arabette des collines	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.
<i>Erysimum nevadense</i> subsp. <i>collisparsum</i> (Jord.) P.W.Ball	Lavande à feuilles étroites
Vélar de Provence	<i>Ligustrum vulgare</i> L.
<i>Microthlaspi perfoliata</i> (L.) Kerguélen	Troène
Tabouret perfolié	<i>Plantago semperflorens</i> Crantz
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Plantain toujours vert
Camerisier à balai	<i>Helleborus foetidus</i> L.
<i>Viburnum lantana</i> L.	Hellebore fétide
Viorne lantane	<i>Rhamnus alpina</i> L.
<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>strictum</i> (Koch) Greml	Nerprun des Alpes
Céraiste raide	<i>Rhamnus pumila</i> Turra
<i>Gypsophila repens</i> L.	Nerprun nain
Gypsophile rampante	<i>Rhamnus saxatilis</i> subsp. <i>infectoria</i> (L.) P. Fournier
<i>Saponaria ocymoides</i> L.	le Nerprun infecté
Saponaire faux-basilic	<i>Amelanchier ovalis</i> Medikus
<i>Cornus mas</i> L.	Amelanchier
Cornouiller mâle	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Aubépine monogyne
Cornouiller sanguin	<i>Potentilla verna</i> L.
<i>Corylus avellana</i> L.	Potentille du printemps
Coudrier, noisetier	<i>Prunus mahaleb</i> L.
<i>Sedum sexangulare</i> L.	Bois de Sainte-Lucie
Orpin à six angles	<i>Prunus padus</i> subsp. <i>borealis</i> Cajander
<i>Hippophaë rhamnoides</i> L.	Prunus boréal
Argousier	<i>Prunus spinosa</i> L.
<i>Orthilia secunda</i> (L.) House	Prunellier
Pyrole unilatérale	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.
<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	Petite sanguisorbe
Pyrole verdâtre	<i>Salix elaeagnos</i> Scop. subsp. <i>eleagnos</i>
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Saule blanchâtre
Euphorbe petit cyprès	<i>Salix purpurea</i> L.
<i>Euphorbia dulcis</i> L.	Saule pourpre
Euphorbe douce	<i>Viola collina</i> Besser
<i>Anthyllis montana</i> L. subsp. <i>montana</i>	Violette des collines
Anthyllide de montagne	<i>Viola hirta</i> L.
<i>Astragalus sempervirens</i> Lam.	Violette hérissée
	<i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt
	Violette des rochers

<i>Carex digitata</i> L.	<i>Larix decidua</i> Mill.
Laîche digitée	Mélèze
<i>Carex flacca</i> Schreber subsp. <i>flacca</i>	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst.
Laîche flasque	Epicéa commun
<i>Carex halleriana</i> Asso subsp. <i>halleriana</i>	<i>Pinus sylvestris</i> L.
Laîche de Haller	Pin sylvestre
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	<i>Pinus uncinata</i> Ramond ex DC.
Orchis tacheté	Pin à crochet
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.
Orchis sureau	Asplenium rue de muraille
<i>Bromus erectus</i> Huds. subsp. <i>erectus</i>	<i>Neottia viridis</i> (L.) Bluff & Fingerh.
Brome dressé	Grande listère
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip.
Seslerie bleue	Camomille inodore
<i>Juniperus communis</i> L.	<i>Taraxacum</i> sp.
Genévrier commun	Pissenlit sp.
<i>Abies alba</i> Mill. subsp. <i>alba</i>	
Sapin blanc	

Le Noyer 05, Sentier de Villars, 1221 m, falaise, 44.689908, 6.001956, terrain calcaire, pente 0.80, alliance phyto Manquant.

13/05/16

<i>Hieracium lawsonii</i> Vill. gr.	Joubarbe aranéuse
Epervière de Lawson	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> subsp. <i>crassifolius</i> (Br.-Bl.) L.
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Villar
Marguerite	Raisin d'Ours
<i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Reichenb. subsp. <i>rostrata</i>	<i>Daphne alpina</i> L.
La Minuartie à rostre	Daphné des Alpes
<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.	<i>Asplenium trichomanes</i> L.
	Capillaire rouge

Le Noyer 05, Sentier Villars, sommet du sentier, 1324 m, hêtre, 44.687848, 5.997516, terrain calcaire, pente 0.15, alliance phyto Fagion, 13/05/16

<i>Trochiscanthes nodiflora</i> (All.) Koch	<i>Convallaria majalis</i> L.
Trochiscanthes à fleurs noueuses	Muguet

### Champignons :

<i>Auriscalpium vulgare</i> Gray	
Hydne cure-oreille	
<i>Strobilurus stephanocystis</i> (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer	
La Collybie à cystides couronnées	
<i>Sarcosphaera coronaria</i> (Jacq.) J. Schröt.	
la Pézize couronnée	
<i>Morchella esculenta</i> (L.) Pers.	
Morille	
<i>Gymnosporangium clavigeriforme</i> (Wulfen) DC., urédinale (rouille) parasite du genévrier commun	

Vendredi 13-5-2016– sentier Dominique Villars – 1200 m

**Liste des insectes et oiseaux établie par Claudie Desjacquot**

Pouillot de Bonelli, Pouillot véloce, Accenteur mouchet, Fauvette à tête noire,

ARA *Pisaura mirabilis*, Pisaure admirable

**COL *Agelastica alni*..... Chrysomèle -** Chrysomelidae – chrysomèle bleue, accouplement avec femelle prête à pondre (abdomen volumineux)

**COL *Agapanthia villosoviridescens*, Agapanthie à pilosité verdâtre – Cerambycidae**

**COL Bousier bleu violet**

COL *Carabus problematicus* ? *intricatus* ? Carabe – noir à reflets violacés sur le pourtour du thorax et des élytres. Elytres à fins sillons et ponctuation

COL Scolytidae -Traces de scolytes sur branches de Pin

DIP *Chrysotoxum festivum*, Syrphe charmant –Syrphidae – thorax marqué de jaune sur les côtés, écusson jaune à centre noir, 3fines bandes jaunes interrompues sur l'abdomen, pattes rousses, ailes enfumées.

Fleurs des bois et des prairies humides.

DIP *Dilophus febrilis* –Bibionidae - accouplement

DIP *Sphaerophoria scripta*, Syrphe porte-plume –Syrphidae – abdomen long et mince

DIP *Bombylius discolor*, Bombyle bicolore – butine en plein soleil en vol stationnaire au-dessus des fleurs.

Parasite les « abeilles solitaires ». Pond à l'entrée de leur nid dans le sol. Les larves dévoreront les réserves de nourritures, puis les larves d'abeilles.

HEM *Dolycoris baccarum*, Punaise des baies

HEM *Gerris lacustris*, Gerris aquatique -

ORT *Gryllus campestris*, Grillon champêtre

TRI Prygane, Porte-bûche –Nombreuses espèces ! larve à l'intérieur de son fourreau composé ici de tout petits graviers. Elle se nourrit et se déplace en sortant la tête et les pattes antérieures.

ARC Chenille d'Ecaille (peut-être *Epicallia villica*, Ecaille villageoise – touffes de soies brunâtre, **pattes et tête rougeâtres** : mais sur ma photo je ne vois pas bien la couleur !)

SAT grand papillon en vol dans la hêtraie : probablement *Aglia tau*, la Hachette (Saturnidae)

PI *Leptidea* sp - Piéride de la moutarde ou espèce proche : détermination certaine, seulement après examen des genitalia.