

# Sortie botanique du 28 mai 2012 : les orchidées à Naves

lundi 28 mai 2012, par [Philippe Pellicier](#)



Une sortie improvisée à la découverte des orchidées de la vallée de Naves a réuni huit personnes. Nous avons visité des pelouses sèches à brome dressé (*Bromus erectus*) où nous avons mis en évidence les plantes qui caractérisent ce milieu : le lotier corniculé (*Lotus corniculatus*), l'hippocrépis à toupet (*Hippocrepis comosa*), la sauge des prés (*Salvia pratensis*), le sainfoin (*Onobrychis viciifolia*), la vesce à feuilles ténues (*Vicia tenuifolia*), le paturin à feuilles étroites (*Poa angustifolia*), les silènes enflé (*Silene vulgaris*) et penché (*S. nutans*), le polygale à toupet (*Polygala comosa*), l'anthyllis vulnérable



(*Anthyllis vulneraria*), etc. La pelouse à brome est le milieu privilégié de nombreuses orchidées : L'homme pendu (*Orchis anthropophorum*), l'orchis militaire (*Orchis militaris*), l'orchis mouche (*Gymnadenia conopsea*) et l'orchis punaise (*Orchis coriophora* subsp. *coriophora*) qui est une espèce rare et protégée dans toute la France. Plus près des lisières : l'orchis pourpre (*Orchis purpurea*), la listère ovale (*Listera ovata*), les céphalanthères de Damas (*Cephalanthera damasonium*) et à longue feuilles (*C. longifolia*).

Un passage dans une zone humide à phragmites (*Phragmites australis*) nous a permis d'observer quelques laïches : la laïche glauque (*Carex flacca*), la laïche panicea (*C. panicea*), la laïche fauve (*C. hostiana*) et aussi le jonc glauque (*Juncus inflexus*).



Dans la pelouse sèche nous avons pu aussi observer un insecte typique des lieux l'ascalaphe (*Libelloides* sp.), moitié papillon, moitié libellule et aussi un escargot à la coquille allongée et zébré (*Zebrina detrita*), une grosse araignée qui porte ses œufs dans un cocon qu'elle porte sous son ventre (*Pisaura mirabilis*).

Une belle sortie programmée à la dernière minute, appréciée par des participants passionnés.